



MaiMed® – MyClean HB Flowpack

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Tücher für die hygienische Händedesinfektion.																										
Anwendung	Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Hände sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen, dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Hände feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch.																										
Auszeichnungen																											
Ausführungen	<table><tr><th>Artikelbeschreibung</th><th>Größe</th><th>Inhalt</th><th>Artikelnummer</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE</th></tr><tr><td>Desinfektionstücher</td><td>20 cm x 12 cm</td><td>15 Blatt</td><td>79770</td><td>4046153141654</td><td>20086328</td><td>63</td></tr><tr><td>Desinfektionstücher</td><td>19 cm x 14 cm</td><td>80 Blatt</td><td>79771</td><td>4046153141678</td><td>20086311</td><td>12</td></tr></table>						Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE	Desinfektionstücher	20 cm x 12 cm	15 Blatt	79770	4046153141654	20086328	63	Desinfektionstücher	19 cm x 14 cm	80 Blatt	79771	4046153141678	20086311	12
Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE																					
Desinfektionstücher	20 cm x 12 cm	15 Blatt	79770	4046153141654	20086328	63																					
Desinfektionstücher	19 cm x 14 cm	80 Blatt	79771	4046153141678	20086311	12																					
Einwirkzeiten	<table><tr><th>Wirksamkeit</th><th>Belastung</th><th>Normen</th><th>Einwirkzeiten</th></tr><tr><td>Bakterizid (Escherichia coli)</td><td>niedrige Belastung</td><td>EN 1500</td><td>30 Sekunden</td></tr><tr><td>Levurozid (Candida albicans)</td><td>niedrige Belastung</td><td>EN 1650</td><td>1 Minute</td></tr><tr><td>Begrenzt viruzid (inkl. Adeno-, Noro-, Rota-Viren)</td><td>niedrige Belastung</td><td>EN 14476</td><td>1 Minute</td></tr></table>						Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten	Bakterizid (Escherichia coli)	niedrige Belastung	EN 1500	30 Sekunden	Levurozid (Candida albicans)	niedrige Belastung	EN 1650	1 Minute	Begrenzt viruzid (inkl. Adeno-, Noro-, Rota-Viren)	niedrige Belastung	EN 14476	1 Minute					
Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten																								
Bakterizid (Escherichia coli)	niedrige Belastung	EN 1500	30 Sekunden																								
Levurozid (Candida albicans)	niedrige Belastung	EN 1650	1 Minute																								
Begrenzt viruzid (inkl. Adeno-, Noro-, Rota-Viren)	niedrige Belastung	EN 14476	1 Minute																								
Zusammensetzung	In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoffe enthalten: 70 g Ethanol, 0,2 g Chlorhexidindigluconat.																										
Chemisch-physikalische Daten	<table><tr><th>Dichte</th><th>Aussehen</th><th>Flammpunkt</th><th>pH-Wert</th><th>Viskosität</th></tr><tr><td>nicht verfügbar</td><td>mit Flüssigkeit getränkte Tücher</td><td>-</td><td>5-6</td><td>nicht verfügbar</td></tr></table>						Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität	nicht verfügbar	mit Flüssigkeit getränkte Tücher	-	5-6	nicht verfügbar											
Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität																							
nicht verfügbar	mit Flüssigkeit getränkte Tücher	-	5-6	nicht verfügbar																							
Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P305 + P351 + P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403 + P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P501: Inhalt/Behälter über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen.																										
Qualitätssicherung	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Registrierungsnummer: N-118360 UFI: VND0-C0YM-J00G-2XHM																										
Verwendbarkeit	2 Jahre / 28 Tage nach Anbruch																										
Symbole																											